

**ΠΡΟΥΠΟΛΕΙΣ:** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Αποθηκεύεται μακριά από τροφή, ποτά και υακρίσματα. Εάν τριπύ, πιπέρι ή καπνός, είναι χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν. Αποφύγετε να συνδέσετε τα φεκατοκίτα σπασίδια. Εάν ζητήσετε ισχυρή συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον τεύχιο του προϊόντος ή την ετικέτα. Συνιστάται να φορέτε γάντια και μάσκα μιας χρήσης για αεροζόλ (EN149 FFP3 ή άλλη ανάλογη) κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.  
-Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.  
-Ποτέ μην *Cydia pomonella granulovirus*. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
**Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:** Αποφύγετε αμέσως τυχόν υψώματα ή βρογχικό σπασμό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπύε το στομάχι αμέσως. Δεν υπάρχει αντίδοτο.  
**Τηλέφωνο Κέντρου Δοκιμασιών:** 2107793777

Μη μιμνήστε το νερό με το προϊόν ή τη σκευασία του! Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών πρέπει να τηρείτε απόσταση (ώδη 5m από το επιφανειακό νερό).

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα των σκευασμάτων: Στην αρχή και καλά κλεισμένη σκευασία του, σε ερμό και προστασία γαλι από ακτινοβολίες θερμοκρασίες πάνω από 5 °C. Διατηρείται για 2 χρόνια σε θερμοκρασία μικρότερη των 5°C. Σε θερμοκρασία μικρότερη των -18 °C, διατηρείται για απεριόριστο χρονικό διάστημα χωρίς να υποβαθμίζεται.

Αθήνα, Παρίσι, Μόναχον, Βερολίνον, Βιέννη, Λονδίνον, Ζυρίχη, Βιέννη

# MADEX-TOP

**Cydia pomonella granulovirus (CrGV) isolate V15**  
(Ιός του τύπου κοκκιδιοκώσεων για καρπόκαθα) 3X10<sup>11</sup> OB/L

**ΑΑΔΑ:** 14.474/13-3-2014 **Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)**

**Εγγυημένη σύνθεση:** *Cydia pomonella granulovirus (CrGV) isolate V15*  
(CrGV-V15) 3X10<sup>11</sup> OB/L  
Βοηθητικές ουσίες 55,2% β/β

**Μικροβιακό εντομοκτόνο**  
(*Cydia pomonella granulovirus*)  
για την καταπολέμηση των προνυμφών  
της καρπόκαψας. Δρα μέσω της κατάποσης.  
Οι μολυσμένες προνύμφες  
πεθαίνουν μετά από μερικές ημέρες.

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

**Περιεχόμενο: 100 κ.εκ.**

**Κέντρο της έγκρισης:**  
Ανδραματίνον Βιότοκος Γερμανίας,  
Τοπ. Δύνη Ζελερτ: 8, 79618  
Rheinwiesloch (Baden, Germany)

**Υπεύθυνος επικοινωνίας:**  
Υπεύθυνος για την τεχνική  
βοήθεια στην αγορά:  
ΧΕΛΛΟΦΑΡΜ ΑΕ

**ΧΕΛΛΟΦΑΡΜ Α.Ε.**

**ΑΘΗΝΑ:**  
Φιλίππου 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.00.00.300  
www.hellafarm.gr - e-mail: info@hellafarm.gr

**ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΗΘΟΔΙΑ (Μηλιά, Αχλαδιά, Καύσινα, Αχλαδιάρια (MASHI)), ΚΑΡΥΔΙΑ:** για την καταπολέμηση των προνυμφών της καρπόκαψας. Δόση 8-25 κ.εκ. / 100 λίτρα φεκα. υγρού ή 10 κ. ε.κ./ στρέμμα (μίσχιο). Όγκος φεκατοκίτα υγρού (λίτρα/στρ.): 40-120. Ένεση φεκατοκίτα πριν την εκκένωση των πρώτων προνυμφών. Επανάληψη κάθε 8-14 ημέρες (ανάλογα με την ηλικία των φρούτων).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργεια/ημερίδα: 10 (πριν 5 εφαρμογές ανά νερό).

\*Επανάληψη εφαρμογής κάθε 8 ημερομηνίες (2 μερικές ημερομηνίες ημέρες αντιστοιχούν σε μια ημερομηνία).

Ο φεκατοκίτα να χρησιμοποιείται νερό, το οποίο (ή αργό το απόγευμα).

**Τρόπος εφαρμογής:** Φεκατοκίτα (με φεκατοκίτα σπασίδια) από τρακτέρ, μηχανοκίνητο ή επάνω.

**Τρόπος παρασκευής φεκατοκίτα υγρού:** Ξεπύε το φεκατοκίτα δοχείο με το απαιτούμενο νερό. Ανακινήστε καλά το προϊόν πριν τη χρήση. Προσθέστε την ποσότητα σκευασμάτων που αναγράφει στην ετικέτα με θέλετε να κατασκευάσει και αναδεύστε. Για να επιτευχθεί η καλύτερη αποτελεσματικότητα το pH του φεκατοκίτα υγρού πρέπει να κλιμακωθεί από 5-8,5.

**Καθορισμός φεκατοκίτα μηχανοκίνητων:** Μετά την εφαρμογή ιδιαιτέρως τελείως το βυθό εφαρμογής και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό το βυθό και όλα τα μέρη του φεκατοκίτα. Αδειάστε τελείως το βυθό και ξεπλύνετε πάλι με καθαρό νερό. Μην ξεπλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής και μη ρίχνετε τα νερά του ξεπλύματος, κοντά σε υδάτινους πόρους.

**Συνδυαστικότητα:** Να μην συνδυάζεται το προϊόν με οποιαδήποτε άλλο προϊόν που μπορεί μεσοσίου ή να αυξήσει το pH του φεκατοκίτα υγρού κάτω από 5 ή πάνω από 8,5. Να μην συνδυάζεται με χημικά σκευασμάτων.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογόνες ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκευασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποφευχθεί:** - Το προϊόν είναι ευαίσθητο στην υπεριώδη ακτινοβολία γι' αυτό είναι προτιμότερο οι φεκατοκίτα να εφαρμόζονται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. - Χρησιμοποιείται νερό με pH 5-8. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν προσθέστε κατάλληλο buffer. - Κατά τον φεκατοκίτα το φυτό δεν πρέπει να είναι υγρό από βροχή ή σταγόνες δροσιάς. - Κατά τον φεκατοκίτα εφερομολογία εφαρμογής καλύτερη απόδειξη του φυτού.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία εφάρμοσαν το σκευασμα:** 6 ώρες.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία εφάρμοσαν το σκευασμα:** 6 ώρες.

**Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας φυτικών και κάθε άλλης παρενέργειας στο φυτό ή το προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

**Τελικότητα επίβλαση πριν τη συγκομιδή:** Μήλοσιν, Καρύδια: 1 ημέρα.  
**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της σκευασίας:** Το κενό μέσο σκευασίας (φιάλες) ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται πρώτο ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο φεκατοκίτα δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταπολέμησης προπριότητας με τριπλά για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποθείνεται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση/ανάκτηση ενέργειας.