

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μην αναπνέετε σκόνη. Να μην έλθει σε επαφή με τα μάτια. Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Κατά την διάρκεια εφαρμογής του σκευάσματος είτε με τη χρήση μέσω εφαρμογής φερόμενων σε τρακτέρ είτε μέσω φορητών συσκευών, οι χειριστές θα πρέπει να φοράνε κατάλληλα γάντια κατά το γέμισμα των μέσων αυτών και κατά την εφαρμογή.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενικές πληροφορίες: Απομακρύνετε αμέσως τα ενδύματα που μολύνθηκαν με το προϊόν. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν απαιτείται, παρέχετε τεχνητή αναπνοή. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν τα συμπτώματα επιμένουν. Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων βάλτε τον ασθενή σε σταθερή πλάγια θέση για τη μεταφορά. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό διατηρώντας ανοικτά τα βλέφαρα για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό. Σε περίπτωση κατάποσης: Εάν τα συμπτώματα επιμένουν συμβουλευθείτε γιατρό. Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας διαθέσιμο κατόπιν ζήτησης.

ΜΗ ΜΟΛΥΝΕΤΕ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ (ΜΗΝ ΞΕΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΜΕΣΩ ΣΤΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΥΣ Η ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ).

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

zίρρυ

GEO 0.4G

**lambda-cyhalothrin (λάμδα-σιαλοθρίν)
Κοκκώδες (GR)**

Εγγραμμένη σύνθεση: lambda-cyhalothrin 0.4 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: μέχρι 95,83 % β/β

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, ευρέως φάσματος, δρα δι' επαφής και δια στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση, για τον έλεγχο μυζητικών και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):

14470/ 13-2-2014

Κάτοχος της άδειας: OXON ITALIA SpA, Via Sempione 195, 20016 Pero (MI), Italy
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον.ΕΠΕ
Ήρας 3, Κορωπί 19400 • Τηλ.: 210 5223834 • e-mail: info@sipcam.gr

Περιεχόμενο: 10 Kg



Αρ. Παρτίδας:
Ημ. Παρασκευής:

Βλέπε επί της συσκευασίας



SIPCAM

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ

Τρόπος δράσης: Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na⁺ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. **Τρόπος εφαρμογής:** Απ' ευθείας εφαρμογή στο έδαφος. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** - **ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ**

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ, ΣΟΡΓΟ, ΚΕΧΡΙ: α) **Αγρόπιδες** (Καραφατιμέ, Κοφτοσκοούληκα) (*Agrotis spp*), **Σιδηροσκοούληκα** (*Agriotes spp*): 1.0-1.5 Χλμ/στρέμμα. Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς.

β) **Προνύμφες Διαβρώπικα** (*Diabrotica virgifera*): 1.2-1.5 Χλμ/στρέμμα. Στα 5-9 φύλλα κατά το αυλάκωμα κατά μήκος των σειρών.

ΒΑΜΒΑΚΙ: **Αγρόπιδες** (Καραφατιμέ, Κοφτοσκοούληκα) (*Agrotis spp*), **Σιδηροσκοούληκα** (*Agriotes spp*): 1.0-1.5 Χλμ/στρέμμα. Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς.

ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Αγρός): **Αγρόπιδες** (Καραφατιμέ, Κοφτοσκοούληκα) (*Agrotis spp*), **Σιδηροσκοούληκα** (*Agriotes spp*): 1.0-1.5 Χλμ/στρέμμα. Κατά τη φύτευση στο βάθος φύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης.

ΠΑΤΑΤΑ: **Αγρόπιδες** (Καραφατιμέ, Κοφτοσκοούληκα) (*Agrotis spp*), **Σιδηροσκοούληκα** (*Agriotes spp*): 1.0-1.5 Χλμ/στρέμμα. Κατά τη φύτευση στο βάθος φύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης.

Παρατηρήσεις: 1. Να μην υπερβαίνεται η μέγιστη συνιστώμενη δόση. 2.

Να μην εφαρμόζεται στη φάση της ανθοφορίας και κατά τις περιόδους δραστηριοποίησης των μελισσών. 3. Εφαρμόζετε το προϊόν απουσία ανέμου.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργεια περίοδο: 1 εφαρμογή σε όλες τις καλλιέργειες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μη εφαρμοσίμο.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας - Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. - Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τη πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. - Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κατανομή του στο έδαφος στα σημεία εφαρμογής του. - Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με το Lambda-cyhalothrin 0,4G. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις πυρεθρίνες. - Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εκθρών/ στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Συνδυαστικότητα: -

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας (σασκούλες, σακίδια) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Το κενό συσκευασίας δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Ο συνιστώμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης του σκευάσματος, κλειστό στην αρχική του συσκευασία και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι δύο χρόνια.