

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ** - Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν η τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια ζώα μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος. Κρατήστε μακριά τα κατοικίδια. Μην το τοποθετείτε σε σωρούς. Σκουπίστε και μαζέψτε αμέσως όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. **Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

**Πρώτες βοήθειες -Αντίδοτο.** ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ .Γενικά: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και ήρεμο. Μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα εάν ο παθών δεν διατηρεί τις αισθήσεις του. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή γιατρό και δείξτε αυτή τη συσκευασία ή την ετικέτα. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. **Σε περίπτωση αναπνευστικής δυσχέρειας:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και ήρεμο. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως τα λερωμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν υπάρχει ερεθισμός. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά και συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική και υποστηρικτική αγωγή.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777**

Αριθμ. Παρτίδας - Ημερ. Παρασκευής - Ημ. Λήξης: Βλέπε επί τη συσκευασία



GB (Κοκκώδες δόλωμα)

Εγγ. Σύσταση: Metaldehyde 4% β/β ,

Βοηθ. Ουσίες 95,94 % β/β

Περιέχει πικραντικό παράγοντα

ΑΑΔΑ.: 5025/12-05-2016

**Κοχλιολεϊμακοκτόνο για την καταπολέμηση σαλιγκαριών και γυμνοσαλιγάκων. Δρα από στομάχου.**

**Μετά από τη λήψη του δολώματος και την αρχική υπερέκκριση βλέννας τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες χάνουν την κινητική τους ικανότητα, παραλύουν και πεθαίνουν**

Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: DE SANGOSSE SA, Bonnel BP 5, F47480 Pont-du-Casse, Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:



Φλέμινγκ 15, Μαρρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900  
www.hellafarm.gr

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:500 γραμ.**

**Φάσμα δράσης:** **Κοχλιολεϊμακοκτόνο για την καταπολέμηση σαλιγκαριών (Κοχλίες) και γυμνοσαλιγάκων (Λεϊμακες Αρίονες)** με δόση α) Καθολική εφαρμογή 500 γρ./ στρ (μέγιστο), β)Πάνω στη γραμμή 500 γρ./ στρ (μέγιστο), γ)Σε ανάμιξη με τον σπόρο 400 γρ./ στρ (μέγιστο), δ) Στο αulάκι σποράς 400 γρ./ στρ (μέγιστο). Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών 4 (ανά 5 ημέρες)

**Πεδίο εφαρμογής:** **Αμπέλια, εσπεριδοειδή, ακρόδρυα, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, μικροί καρποί , Φράουλα (υπαίθρου):** Καθολική εφαρμογή ή πάνω στη γραμμή φυτείας. Έως τέλος άνθησης/ BBCH69. **Πατάτα (υπαίθρου):** Καθολική εφαρμογή. Έως 7 ημέρες πριν τη συγκομιδή/ BBCH97. **Λαχανικά (κραμβοειδή, φυλλώδη), Εδώδιμα αρωματικά φυτά Καθολική εφαρμογή (υπαίθρου):** Έως την έναρξη έκπτυξης των πλευρικών ματιών, του σχηματισμού κεφαλής ή ροζέτας/ BBCH40. **Αγκινάρα (υπαίθρου):** Καθολική εφαρμογή. Έως την εμφάνιση της κεφαλής /BBCH39. **Νωπά ψυχανθή και όσπρια(υπαίθρου):** Καθολική εφαρμογή. Έως την έκπτυξη 5 φύλλων /BBCH15. **Ζαχαρότευτλα, κτηνοτροφικά τεύτλα και άλλα ριζωματούδη κηπευτικά, Αραβόσιτος, Γλυκοκαλάμποκο, Σόργο, Κεχρί (υπαίθρου):** Στο αulάκι σποράς ή καθολική εφαρμογή. Έως την έκπτυξη 5 φύλλων/ BBCH15. **Ελαιούχοι σπόροι (εκτός από αραχίδα) (υπαίθρου):** Στο αulάκι σποράς ή καθολική εφαρμογή. Έως την έκπτυξη 7 φύλλων /BBCH17. **Σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, τριπikάλε) (υπαίθρου):** Σε ανάμιξη με τον σπόρο ή καθολική εφαρμογή. Έως την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους / BBCH30. **Νέοι λειμώνες (σίκαλη) (υπαίθρου):** Καθολική εφαρμογή. Έως την έκπτυξη 5 φύλλων /BBCH15. **Καλλωπιστικά φυτά και για δρεπτά άνθη, Χλοτάπητες (υπαίθρου):** Καθολική εφαρμογή σε όλα τα στάδια . **Φράουλα (θερμοκηπίου):** Καθολική εφαρμογή ή πάνω στη γραμμή φυτείας. Έως τέλος άνθησης/ BBCH69. **Μαρούλι και άλλα φυλλώδη λαχανικά, Αρωματικά φυτά (θερμοκηπίου):** Καθολική εφαρμογή. Έως την έναρξη έκπτυξης πλευρικών ματιών, ή τον σχηματισμό κεφαλής ή ροζέτας /BBCH40. **Καλλωπιστικά φυτά και για δρεπτά άνθη (θερμοκηπίου):** Καθολική εφαρμογή σε όλα τα στάδια. **Τρόπος εφαρμογής:** Σκορπίζεται α) ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του εδάφους ή της καλλιέργειας(καθολική εφαρμογή), β) τοπικά πάνω στη γραμμή φυτών, γ) τοπικά μέσα στο αulάκι κατά τη σπορά ή το φύτεμα δ) σε ανάμιξη με τον σπόρο. Εφαρμόζεται κυρίως με μηχανοκίνητο διανομέα κοκκωδών σκευασμάτων με περιστρεφόμενους φυγόκεντρους δίσκους. **Επιτρέπεται η εφαρμογή του και με το χέρι ιδιαίτερα σε μικρή έκταση εφαρμογής, σε καλλιέργειες θερμοκηπίου και/ή πάνω στη γραμμή. Να φοράτε προστατευτικά γάντια κατά την εφαρμογή.**

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο ή τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν αναμένεται βροχή. Να εφαρμόζεται με υγρό καιρό όταν τα σαλιγκάρια είναι περισσότερο δραστήρια. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την περιοχή εφαρμογής σε νέους λειμώνες (από σίκαλη) για τουλάχιστο 49 ημέρες (δηλ. 7 εβδομάδες) από την τελευταία εφαρμογή. **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Εσπεριδοειδή, Ακρόδρυα, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αμπέλια, Μικροί καρποί, Φράουλες: BBCH 69 (τέλος άνθησης), Ζαχαρότευτλα κ.α. κτηνοτροφικά τεύτλα και ριζωματούδη κηπευτικά, Αραβόσιτος, Γλυκοκαλάμποκο, Σόργο, Κεχρί, Νωπά ψυχανθή και Όσπρια: BBCH 15 (5 φύλλα), Λαχανικά (κραμβοειδή, μαρούλι κ.α.φυλλώδη), εδώδιμα αρωματικά: BBCH 40 (έναρξη σχηματισμού κεφαλής ή ροζέτας ή έκπτυξης πλευρικών ματιών), Αγκινάρα: BBCH 39 (εμφάνιση της κεφαλής), Ελαιούχοι σπόροι (εκτός από αραχίδα): BBCH 17 (7 φύλλα), Σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη, τριπikάλε): BBCH 30 (έναρξη επιμήκυνσης στελέχους), Πατάτα: 7 ημέρες, Νέοι λειμώνες (σίκαλη): (5 φύλλα) **49 ημέρες πριν την επιστροφή των παραγωγικών ζώων ή πριν την κοπή των φυτών για βόσκηση. Παρατηρήσεις:****1)** Η συνιστώμενη μέγιστη συνολική δόση είναι 1,75 κιλό προϊόντος ανά στρέμμα, ανά καλλιέργεια και ανά έτος και ο μέγιστος συνιστώμενος αριθμός εφαρμογών είναι 4 ανά καλλιεργητική περίοδο. **2)** Εφαρμόζεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο όταν τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες είναι σε έντονη δραστηριότητα, προληπτικά ή με τις πρώτες ζημιές στα φυτά. **3)** Για την παρακολούθηση της προσβολής και την έγκαιρη εκτίμηση του κινδύνου προσβολής συνιστάται η χρήση ειδικών παγιδιών. **4)** Για καταπολέμηση των γυμνοσαλιγάκων να εφαρμόζεται πριν αναρριχηθούν στην κόμη του φυτού. **5)** Εάν εφαρμόζεται με ανάμιξη με τον σπόρο η ανάμιξη αυτή πρέπει να γίνεται σχολαστικά πριν και κατά την εφαρμογή. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάματος:**Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο καλά αεριζόμενο, ξηρό, δροσερό και θερμοκρασία περιβάλλοντος < 35°